



# Голубка моя

Орлик, водособор, голубка – все это названия одного и того же растения. Аквилегия – находка для «ленивых интеллигентов», с ней можно получить большой декоративный эффект при минимальном уходе

ТЕКСТ ИРИНА БОЧКОВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ДЕКОРАТИВНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЛЕСА

**A**квилегии – растения из разряда «посадил и забыл»: есть уход – хорошо, нет ухода – пышное цветение все равно обеспечено. Этим и объясняется их неугасающая популярность.

Род Аквилегия (*Aquilegia*) насчитывает около 120 видов, из которых примерно 35 широко используются в культуре. Это травянистые растения с красивыми рассеченными листьями, часто с сизоватым оттенком, собранными в прикорневую розетку. Цветки одиночные, поникающие, разнообразной окраски. Венчик цветка состоит из пяти лепестков, похожих на воронку со шпорцами различной формы и длины.

## Виды и сорта

Садовая классификация разделяет виды аквилегии на группы по длине и характеру шпорцев:

- у европейских видов шпорцы загнуты крючком или кольцеобразные: а. альпийская, а. железистая, а. обыкновенная, а. олимпийская;
- у американских видов шпорцы длинные и прямые: а. голубая, а. канадская, а. калифорнийская, а. золотистая, а. Скиннера;
- у видов из Китая и Японии цветки без шпорцев.

В зависимости от вида высота растений колеблется от 30 см (а. вееролистная) до 100 см (сорта аквилегии обыкновенной). В последнее время появилось много новых сортов, объединенных под названием «аквилегия гибридная». Особой популяр-

ностью пользуются гибриды серии Spring Magic, отличающиеся небольшой высотой (до 35 см) и разнообразной окраской цветков. Нельзя пройти мимо аквилегии вееровидной (*A. flabellata*), особенно ее карликовых сортов, пригодных для выращивания не только в саду, но и летом на балконе.

Период цветения большинства видов и сортов приходится на июнь и длится 2–4 недели. Есть и исключение из правил – а. Скиннера цветет в августе.

## Место в саду

Аквилегия предпочитает полузатененные и тенистые места в саду, достаточно влажные почвы. К почвенным условиям не слишком требовательна, но лучше развивается на рыхлых, богатых органикой субстратах (на 1 кв. м желательно добавлять при посадке ведро перегноя или компоста). Возможно выращивание аквилегии и на солнечных участках, но в этом случае цветки будут намного мельче, да и длительность цветения значительно сокращается.

## Условия выращивания

Корневая система состоит из многочисленных ветвистых утолщенных корней, проникающих у взрослого растения на глубину до 60 см. Почки возобновления образуются наверху, и ежегодно куст выпирает из земли, поэтому аквилегии нуждаются в ежегодной подсыпке субстрата к основанию куста. Но и при соблюдении этого правила растения возобновляют каждые 3–4 года.



Spring Magic 'Mix'



Spring Magic 'Navy & White'



Аквилегия гибридная



Black Barlow



Spring Magic 'Rose & White'



'White Star'



'White Barlow'



'Nora Barlow'



'Blue Barlow'

После цветения цветоносы срезают – в противном случае возможен обильный самосев. Сортовые качества при семенном размножении не передаются, и в потомстве будут преобладать растения синей или сиренево-розоватой окраски.

Цветоносные побеги срезают на всю длину, до прикорневых листьев, иначе может возникнуть повторное цветение осенью, что ослабляет растения, и цветение в будущем году будет значительно хуже.

Если почва заправлена правильно, подкормки можно начинать на 2–3-й год после посадки. За сезон проводят три подкормки. В начале роста, в мае, вносят комплексное удобрение с преобладанием азота, для

стимулирования вегетативного роста. В начале цветения – с преобладанием фосфора и калия, а последняя – после цветения, комплексным удобрением с равными частями макроэлементов. Осенью листву срезают полностью, зимует растение без укрытия.

### Размножение

Деление взрослых кустов – один из возможных способов размножения аквилегии. Но он скорее вынужденный, чем обязательный. Деленки долго болеют, и процент выпада достаточно большой. Так размножают в основном редкие махровые сорта – лучшие в апреле, до появления большого количества листьев.

Самый надежный способ размножения – семенной. Используют только свежие семена (срок хранения семян не более 1 года). Лучший срок посева – осенью, под зиму, в этом случае семена проходят естественную стратификацию и всходы получаются более дружными. Зацветают сеянцы на второй год (исключение – гибриды из серии «Экспресс-многолетники», которые при посеве в закрытом грунте в феврале зацветают уже в июне). ▶



О принципах создания  
миксбордера –  
на [supersadovnik.ru](http://supersadovnik.ru)



## СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРУ

- ▲ Для влюбленных в образ старого запущенного сада это самое желанное растение – рассеивается по всему участку, вырастает там, где его совсем не ждали. Для любителей порядка можно порекомендовать своевременное удаление отцветших цветков – тогда растение будет держать себя в рамках приличий.
- ▲ Благодаря видовому и сортовому разнообразию можно подобрать растения под любой вид цветника: низкие – для рокария или на передний край миксбордера, средние и высокие – для групповой посадки или в миксбордер. Благодаря глубоко залегающим корням аквилегии хорошо себя чувствуют и в приствольных кругах деревьев, и среди камней.
- ▲ Не стоит создавать загущенные посадки из аквилегий или сажать рядом с ними крупные, плотнокустовые многолетники – без надлежащего проветривания растения могут заболеть мучнистой росой или фитофторозом.
- ▲ Цветки у аквилегий расположены высоко над основной массой листьев, хорошо просматриваются со всех сторон, поэтому создается ощущение «букета». Легкие ажурные соцветия и разрезные листья прекрасно смотрятся с баданами, хостами, папоротниками, злаками, люпинами, высокорослыми колокольчиками, ирисами, купальницами, бруннерой, астильбой.
- ▲ При недостатке или избытке влаги листва после цветения может пожелтеть и увянуть, поэтому не стоит создавать из аквилегий в цветниках больших куртин – достаточно 2–3 растений (в зависимости от размера), иначе трудно будет оперативно замаскировать провал в композиции.




ФОТО ОЛЕГ КУЛАГИН, ОКСАНА РОГ, ТАТЬЯНА ШКОНДИНА