

Немногие садовые растения могут сравниться по практичности и изяществу с цветущими **анемонами** (*Anemone*) и **ранункулюсами** (*Ranunculus*), тянущими свои яркие головки на встречу лучам ласкового и нежного солнышка. Известно много видов этих интересных растений. Все они относятся к семейству **лютиковых** (*Ranunculaceae*). В природе они произрастают в европейской части

укрытие на зиму совсем не помешает. Разделять и пересаживать желательно только в конце периода вегетации, то есть в начале лета. Красивы и привлекательны сорта: **'Blue Shades'** (голубая), **'Rosea'**, **'Charmer'** и **'Pink Star'** (с различными оттенками розового), **'Radar'** (пурпурно-красная с яркой белой серединкой), **'Violet Star'** (светло-фиолетовая с белым центром).

Очень популярная среди профессионалов и цветоводов-любителей белоцветная форма **'White Splendour'**. Этот сорт анемоны не очень высокий. Растения всего до 15 см высотой с цветками до 3,5–4 см в диаметре. В связи с этим она широко используется как прекрасное весеннецветущее почвопокровное растение на альпийских и каменистых горках, на хорошо ухоженных лесных опушках и пологих



Анемона корончатая (*A. coronaria* 'Lord Leitenant')



Ранункулюс африканский


России, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Южной Европе и Японии. Насчитывается около 150 различных видов анемонов.

Среди анемонов или ветрениц, хорошо известны такие, как аппенинская, кавказская и еще много других интересных видов. Но лично мне более всего по душе **анемона нежная** (*A. blanda*) и **анемона корончатая** (*A. coronaria*).

Анемона нежная (*A. blanda*) цветет в апреле-мае примерно 20–25 дней. Корневище у нее вытянутое, клубневидное, диаметром от 2 до 5 см. В условиях средней полосы их лучше выращивать на солнечных или полутенистых участках с рыхлыми, плодородными, но достаточно увлажненными почвами. Листья на длинных черешках, трижды рассеченные. Зимостойкая, но профилактическое

Это интересно

Семейство лютиковых включает около 50 родов и свыше 2000 видов, представленных преимущественно в умеренных и холодных областях земного шара. Они широко распространены по всем континентам, особенно в северной внетропической зоне. Наиболее богато родами и видами лютиковых Голарктическое царство. В его пределах только в Восточно-Азиатской флористической области сосредоточены две трети всех родов (36 родов, из которых 11 – только в этой области), а 28 родов встречаются в Циркумбореальной флористической области. В Арктике число родов и видов не так многочисленно, но они составляют важный элемент флоры. В тропиках и субтропиках лютиковые встречаются значительно реже и в основном в горных районах. Здесь также имеются эндемичные роды.



Ранункулюс персидский

склонах, а также как почвопокровная культура, изумительно прикрывающая нижнюю, наименее эстетически выдержанную часть тюльпанов, нарциссов или достаточно редко посаженных гиацинтов. Этот сорт анемоны также исключительно хорош в качестве разделяющих и окаймляющих посадок на больших регулярных клумбах или вдоль садовых и парковых дорожек. Они хороши и сами по себе, посаженные небольшими группами

на фоне обычных или серебристых хвойников, декоративной лещины, разноцветных барбарисов и других декоративно-лиственных кустарников. Исключительно хорошо сочетаются с низкорослыми тюльпанами и контрастными по окраске гиацинтами и нарциссами. По мне, так они просто настоящие произведения искусства!



Анемона корончатая (*A. coronaria* 'Monarch de Caen')

Анемона корончатая (*A. coronaria*) или **маковидная**, — это многолетнее декоративное садовое растение. Ее цветки, отчасти напоминающие цветки мака, бывают простой, махровой и полумахровой формы самых различных окрасок, с диаметром цветка 5–8 см. Высота растений 30–40 см. Ее можно сажать как весной, так и осенью. При осенней посадке растения обычно зацветают в мае–июне, весенняя посадка обеспечит цветение в июле–августе. У меня в прошлом году эти анемоны дружно цвели все лето и осень, и до самого конца октября, составив отличную пару в букетах белым и голубым октябринкам. Безусловно, часть цветков поражалась ночными заморозками, но как только днем вновь пригревало осеннее солнышко, тут же открывались другие сохранившиеся бутоны, в течение 3-х недель поставляя мне великолепный флористический материал во второй половине октября — начале ноября, когда все остальные растения (может быть, за исключением последних бутонов роз) уже уснули или давно заморзли.

Ранункулюсы, или **лютики**, — это травянистые корневищные многолетники с простыми и густомахровыми цветками разнообразной окраски, кроме синей и голубой,

◀ Анемона корончатая (*A. coronaria* 'St.Brigid Red')





Фото автора

Ранункулюс африканский

цветущие в июне — июле. Соцветия обычно шаровидной формы диаметром до 8–10 см, чем-то напоминают соцветия миниатюрных роз, небольших шаровидных хризантем или гелихризума. Растения высотой до 40 см, с глубоко рассеченной листвой и короткими сильными стеблями. Большая часть садовых форм имеет махровые или полумахровые цветки. Окраски яркие и разнообразные — от белой, розовой до оранжевой и темно-пурпурной. Их используют для посадки на клумбах, рабатках, в миксбордерах, рокариях, балконных и напольных вазах, а также для срезки и выгонки.

Имеются многочисленные садовые разновидности и сорта. У нас в основном выращиваются два вида **ранункулюсов**: более холодостойкие **азиатские** (их еще называют персидскими) и **африканские** (или чалмовидные) с более крупными листьями и цветками и с загнутыми внутрь лепестками. Они очень напоминают махровые пионы. Оба вида в условиях средней полосы России в грунте не зимуют. Их сухие шишечки-корневища покупают в конце зимы или весной и хранят до посадки при умеренных температурах в хорошо проветриваемом месте.

ПОСАДКА И УХОД

Клубни анемона и ранункулюсов высаживают в марте на рассаду или в мае

Анемона нежная
(*A. blanda* 'Blue Shades') ▶



Фото автора



Ранункулюс персидский



Ранункулюс персидский (махровая форма)

Растения вполне хорошо себя чувствуют, в том числе и на открытых, часто продуваемых ветерком местах.

после заморозков сразу в открытый грунт. Корневища желательно предварительно замочить в воде или лучше в растворе стимулятора роста в течение 8–10 часов. Глубина посадки примерно 5 см, расстояние между растениями должно быть не менее 10–12 см. Полив умеренный, поскольку в слишком влажной почве клубни этих растений могут плесневеть или загнивать. Они лучше

всего смотрятся и значительно дольше цветут на умеренно затененных клумбах. Сажают их группами по несколько растений или довольно большими массивами. Из новинок последних лет очень рекомендую изумительный темно-синий махровый сорт анемоны 'Lord Leitenant' и ранункулюс пурпурный.

В августе, после отмирания листьев, ранункулюсы и анемоны ко-

рончатые выкапывают. Корневища хорошо просушивают и хранят в бумажных пакетах или коробках в хорошо проветриваемом месте с умеренной комнатной температурой. С клубнями-шишечками ранункулюсов, которые сильно напоминают уменьшенные клубни георгин или сложенные вместе пальцы одной руки, обращаются очень осторожно, поскольку отдельные их части легко обламываются. В более южных районах лютики и корончатые анемоны легко зимуют с укрытием.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Размножают анемоны и ранункулюсы делением корневищ, осторожно отделяя их во время выкапывания, или свежими семенами сбора предыдущего года, которые сеют в парник. В первый год они цветут редко. Их, так же, как и взрослые растения, нужно выкопать и сохранить до следующей весны, как было сказано выше. Семена ранункулюсов высевают в ящики с легким песчаным грунтом. Слегка присыпают землей, накрывают стеклом и ставят в освещенное место. При температуре +10...+15 °C всходы появляются через 2–3 недели. Сеянцы содержат при умеренной температуре, пикируют в фазе 4–5 настоящих листьев. Для ранневесеннего цветения высе-

Анемона нежная 'White Splendor' и гиацинт 'Woodstock'





Анемона корончатая

вают на рассаду в ноябре, а для летнего — в феврале-марте. Растения прекрасно выгоняются в течение всей зимы, для этого их периодически высаживают небольшими партиями, начиная уже с сентября. При досвечивании они зацветают через 3–3,5 месяца после посадки.

Анемона корончатая и ранункулюсы дают прекрасную срезку. Свежесрезанные ветреницы и лютики «живут» в вазе от 5 до 8 дней. Они чувствительны к высоким температурам и сквознякам. Нужно удалить все листья, которые окажутся ниже уровня воды, подрезать стебли под водой и поместить их в чистую вазу с прохладной или холодной, предварительно отстоянной водой. Ветреницы и другие цветы старайтесь не ставить в одну вазу вместе с нарциссами, так как нарциссы часто губительно действуют на своих соседей.

Считается, что анемоны и ранункулюсы предпочитают теплые, хорошо защищенные от ветра места. Думаю, что это не совсем так. Безусловно, тепличные или близкие к ним условия понравятся большинству известных растений, так как у нас на участках не всегда есть большой выбор места для посадки и, тем


более, подходящих для каждого растения почв. Из своего личного опыта могу сказать, что эти растения вполне хорошо себя чувствуют в том числе и на открытых, часто продуваемых ветерком местах. Да и к почвам они не особенно привередливы. Но, спору нет, влажная и теплая, но при этом рыхлая и хорошо дренированная, а также богатая гумусом почва будет им более по вкусу.

Далее можно много рассуждать о том, как анемоны корончатые надо на зиму мульчировать и укрывать, но я этого преднамеренно делать не буду по трем причинам. Судите сами — это

отнимает массу времени осенью, когда и без этого есть множество объектов на участке, которым нужно уделить внимание, а выходные дни уже такие короткие и холодные. Да и зимы в последние годы не были слишком суровыми. Более-менее суровые зимы в условиях Подмосковья сейчас бывают в среднем раз в шесть-восемь, а то и десять лет. Ну и, наконец, сам мульчирующий материал может стоить намного дороже самих анемонов. Проще каждый год подсаживать немного новых растений, чем сильно печалиться о том, как сохранить уже имеющиеся экземпляры, за исключением, конечно, каких-то редких или очень любимых вами сортов и экземпляров. Это же относится и к лютикам. Кроме того, посаженные весной или ранним летом растения зацветут летом или ближе к осени и тем самым еще более продлят сезон цветения этих прекрасных растений.

Уважаемые покупатели!

Анемоны и ранункулюсы Вы можете заказать по электронной почте catalog@fragil.ru
Я всегда готов принять у Вас заявку и ответить на все Ваши вопросы.
Сергей Коваленко



Ранункулюс персидский ▶