

едний.
r Ton).
рядов
зовых
и не-
оких с
лени-
одий,
ветка
ново-
чень
зный
днее
хро-
Аро-
ый.
ий.
ren
кого
кий
Аро-
ый.
ий.
id-
он-
ко-
уст
ль-
е-
b-
ок
с-
65
ий
ия
е-
о-
).
е-
.



Привитые или корнесобственные?

В №8 за 1995 г.

*мы уже обращались
к этому вопросу.*

*Наш крымский автор
А.В.Козлов отдавал
пальму первенства
корнесобственным
розам.*

*Но так ли это
однозначно?*

Культура **корнесоб-
ственных** роз подкупает
простотой и легкостью по-
лучения саженцев. Корне-
вая система образуется за
2,5-3 месяца, а то и быст-
рее. Но такой саженец не
может служить полноцен-
ным посадочным матери-
алом для посадки в грунт
осенью, так как у него не-
доразвиты корни. Имею-
щаяся у черенков густая
мочка молодых водянист-
ых неодревесневших ко-
решков при охлаждении
до минус 0,5° подмерзает и
загнивает. Вслед за этим
погибает и все растение.
Такие розы нуждаются в
доразвивании. Корневая
система с крупными ске-
летными корнями форми-
руется у них только на вто-
рой год. И лишь на следу-
ющий растение набирает
силу и уже ни в чем не ус-
тупает привитому, а часто
даже и превосходит его в
пышности цветения и дол-
голетия. Примером может
служить куст розы, расту-
щий в г. Гундельсгейме
(ФРГ). Специалисты дают
ему 800-1000 лет, и не-
смотря на столь преклон-
ный возраст, он ежегодно
цветет.

Привитой саженец состо-
ит из 2 растений: подвоя
(корня) - шиповника и
привоя - культурной розы.
В условиях Подмоскovie
на выращивание подвоя
уходит 2-3 года. Поэтому
привитые растения в пер-
вые 1-2 года обгоняют в
развитии корнесобствен-
ные розы за счет сильного
3-летнего корня. Но цвето-
вод постоянно вынужден
подавлять (иначе куст
одичает) дикуую поросль
подвоя, поэтому к 8-10 го-
дам корень шиповника
слабеет, растение хиреет и
отстает в своем развитии
от корнесобственных. А те,
напротив, только входят в
силу.

Чему отдать предпочте-
ние, зависит и от климати-
ческих условий района. В
южных областях, в сухом и
жарком климате, корне-
собственные розы без по-
лива плохо растут, цветут
скупо, страдают от сухове-
ев. В северо-западных, вос-
точных и даже северных
районах страны, где ус-
пешная перезимовка роз
возможна под изрядным
слоем снега, наиболее под-
ходящими будут корнесоб-
ственные саженцы. В ко-
роткое северное лето их
можно высаживать в сад в
емкостях, а на зиму вно-
сить в дом или хранилище.
Оптимальная температу-
ра при хранении корнесоб-
ственных роз от минус 2° до
6° и от минус 2° до 0° для
привитых.

Е.В.Фролов
Москва