

ШАЛОЕ НАШЕСТВИЕ СИРЕНИ



Обычно у сиреней цветковые почки раскрываются одновременно с находящимися рядом листовыми. Облиственные побеги отрастают полностью к окончанию цветения и на следующий год из них формируются новые цветочные почки. У ряда ранних сортов Петериса Упитиса развитие цветочных и листовых побегов протекает независимо. Эти сорта цветут исключительно обильно, а листовые почки «замирают» в ожидании нового цикла, который наступает для них только в следующем году.



Давайте познакомимся с этими ранними практически неизвестными у нас сортами простых сиреней выдающегося латышского селекционера.

Продолжительно цветущий сорт **'Esibas Prieks'** (радость бытия), 1950 отличается необыкновенно лёгкими «пушистыми» соцветиями, сформированными из нескольких цветковых почек на верхушечных побегах. Кусты сильные, пышные, но невысокие.

Мажентовый сорт **'Daudzpusigais Zemzaris'** (разносторонний Земзарис), 1963, зарегистрирован в Канаде в 1976 году. Он назван селекционером в честь своего близкого друга. Бутоны у сирени пурпурно-фиолетовые. Цветки крупные, пурпурно-красноватые. Соцветия средние, плотные, составлены из двух конических метёлок-рогулек. Кусты средние, широкие. Цветение среднепозднее. Следует отметить, что габитусом куста этот сорт очень напоминает более раннее легендарное колесниковское **'Знамя Ленина'**, у которого те же голенастые верхушечные побеги с огромными, в виде «хоругвей», соцветиями. На побегах, как и у ушницинского сорта, имеются многочисленные набухшие листовые (вегетативные) почки.

Возникает вопрос, не связаны ли эти сорта генетически? Известно, что Ушницин был хорошо осведомлён о сиренях Колесникова. Слава Колесникова в 50—60-х годах гремела тогда по всему Советскому Союзу. Поэтому вполне возможно, что **'Знамя Ленина'** побывало в руках латышского учёного и использовано им в селекционной работе.

У сорта **'Daudzpusigais Zemzaris'** периодичность цветения выражена ярче, чем у других сортов Ушницина. В следующий за обильнейшим цветением на безлистных верхушечных побегах год сирень не цветёт, а бурно отрастывает листовую массу из прошлогодних почек.

Ещё одна особенность сорта состоит в том, что в обильный год зацветают также прошлогодние побеги в нижней части стволов привоев. Они голенасты, почти лишены листьев, как и верхушечные побеги. Куст при этом выглядит весьма причудливо, словно искусственно созданная композиция с двухэтажно цветущей похожей на фонтан кроной! Таким образом, резкий всплеск уровня гормонов цветения приводит к зацветанию буквально всех прошлогодних побегов куста. У такого куста всё подчинено цветению. Растение предаётся ему без оговора. Это свойство доминирует и солирует. Цветущие концы верхушечных безлистных побегов выглядят так словно приготовленные для срезки букеты!

Но на этих побегах есть и листовые вегетативные почки. И те из них, которые расположены ниже распустившихся кистей, набухают, но не пробуждаются даже после окончания цветения. В этом году их развитие приостановлено, хотя всё лето ещё впереди! Эти почки распустятся только весной следующего года (данные д-ра С. Страутини — куратора коллекции латвийских сиреней). ❀



'Esibas Prieks'



'Dobeles Meitene'



"Vidsemes D



Сорта: 'Vidsemes Debesis' (видземские небеса), 1965.

Цветки средние розово-фиолетовые, затем голубеют, становятся чистыми майскими небесами. Соцветия большие, шишкообразные. Цветение раннее. Кусты компактные.

'Jaunkalnavas Nakts' (юноша из Яункалнава), 1958. Цветки

крупные, голубо-фиолетовые, словно светлые майские небеса. Соцветия большие, пирамидальные. Цветение среднее, позднее, обильное и регулярное. Кусты сильные, средние.

'Dobeles Meitene' (девушка из Добеле), 1980. Кусты компактные. Верхушечные побеги с многочисленными метелками, сложенными в огромные соцветия. Цветение обильное, эффектное.

"Daudzpusisgais Zē