

ОСЕВЕРЕНИЕ ЮЖАНКИ



Не плачьте
обо мне —
я проживу
счастливой нищей,
доброй
каторжанкой,
озябшею на севере
южанкой.

Белла Ахмадулина

17%

сахаров содержат плоды
самых сладких сортов
черешни

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

На Украине находилась половина черешневых садов СССР, потому с детства знаю, что черешня — лучшая ягода на свете. В справочнике того времени прочитал, что это «дерево из рода вишен семейства розовых, с яйцевидной кроной, с крупными листьями, с белыми или розовыми цветками». Те, кто в отличие от меня садовую литературу не читал, называли её шпанкой. Впрочем, как и старый садовник, который когда-то служил в господском саду и про шпанку, шпанскую вишню мог прочитать в книге «Русский огород, питомник и плодовый сад» Р. И. Шредера. Лучшая ягода оттого, что сначала она самая ранняя, потом самая спадкая. Не случайно немцы

называют черешню сладкой вишней, а ту, что у нас просто вишня — кислой. К поеданию её мы приступали в последние дни мая, когда только успевали побуреть ягоды на самой вершине. А силы в этом дереве непомерные, всякий раз лезешь, лезешь и думаешь, зачем же так высоко забрались эти черешенки. И, правда, это «птичья вишня», она доступна для птиц больше, чем для человека. Пока мы обносили верхушки, начинали созревать низы. Ещё недели две спустя несорванные плоды, грубо говоря, наливались мёдом. О том, какой вкус у спелой черешни, рассказывать тем, кто её не пробовал, бесполезно, а тем, кто его помнит, не стоит. Такой вкусной

в том же состоянии может быть ещё только слива.

Люблю черешню за вкус крупных тёмно-красных или янтарно-жёлтых плодов, за мощь, красивые листья и цветы, за ежегодное обильное плодоношение.

В 90-е годы вырастил с братом на Украине около 8 тысяч саженцев черешни. Какое же это благодарное растение: приживаемость окулировок почти стопроцентная, уже в первый год вырастает побег в два метра, на второй формируется крона, а ещё через пару лет пойдут первые урожаи. Долго бился за черешню на лесной даче в Рузе: пробовал приспособить к тамошнему климату сеянцы южных сортов, затем сорта

ской и ленинградской селекции, росло и мёрзло, если не стволы, так и почки, если не побеги, так почки, если не ростовые почки, так плодовые. Ягод Злет ни разу не было. Шесть лет назад, чтобы не мучились, все черешни опал, раздал владельцам участков более подходящим микроклиматом, «розовую» и «Ипуть» пересадил на новую дачу. На высоком месте, где те подмосковные морозы, но нет застоя холодного воздуха, где песок высыхает, как только кончается дождь, а солнце прикрывает огромными соснами, вот уже четыре года черешни родят немало и вкусно, особенно нынешним летом. Конечно, урожай собираем куда больше, чем черешню, а на юге она крупнее и слаще.

но урожай радуют. Сто сорок лет назад Шредер писал, что черешня «зимует под Москвой только под хорошей покровкой: разводится большей частью в вишнёвых сараях». А через несколько десятилетий И. В. Мичурин получил северную черешню, что, по его словам, стало «доказательством того, что суровые условия нашего края не могут служить препятствием к получению новых выносливых сортов черешни». В 1964 году творец трёх «ленинградских» сортов — чёрной, розовой и жёлтой — Ф. К. Тетерев издал книгу «Черешня и биологические основы её осеверения» (М., «Наука»). А теперь уже есть десятки сортов для севера, и я точно знаю, что черешня в Подмоскovie возможна без вся-

кого укрытия. Надо только проанализировать микроклимат участка. Допускаю, что в большинстве случаев диагноз будет отрицательным. Тогда придётся смириться или предпринимать чрезвычайные меры, обнести участок или часть его высокой стеной, например. Отказаться обидно, но что поделаешь. Хуже будет, если посадите черешню там, где она расти не может, и только мучается: деньги, время и силы потратите, а потом скажете в сердцах: не наша это культура. Если ответ положительный, то нужно подобрать самые подходящие сорта, а их с каждым годом становится всё больше. Подробно об этом вам расскажет в своей статье кандидат сельскохозяйственных наук **Анатолий МИХЕЕВ**.



последние годы появились новые перспективные сорта черешни, подходящие для выращивания в средней полосе России, что подогрело интерес к этой культуре, увеличился спрос на посадочный материал. Северные сорта черешни, в отличие от вишни, почти не поражаются опасным грибным заболеванием — монилиозом. В то же время садоводы-любители часто жалуются на слабый рост и плодородие деревьев, а то и их гибель. В чём же причина неудач?

Остановлюсь на наиболее часто повторяющихся ошибках. Прежде всего, не нужно забывать, что черешня относится к южным теплолюбивым культурам. Сегодня Подмоскovie — северная граница её выращивания. Многолетние наблюдения показали, что при постепенном снижении температуры крона дерева может выдерживать морозы до -30°C . Более опасны для неё $-20\ldots -25^{\circ}\text{C}$ в начале зимы, когда растения не успели пройти «закаливание». Весенние (в марте) морозы $-15\ldots -20^{\circ}\text{C}$ после оттепелей $0\ldots +2^{\circ}\text{C}$ также причиняют значительный ущерб цветковым почкам и годичным приростам. Повреждения бутонов, цветков и молодых завязей у черешни бывают чаще, чем у вишни, из-за меньшей их зимостойкости и более ранних сроков цветения. Такие неблагоприятные погодные условия чаще повторяются к северу и север-востоку от Москвы и реже — к югу. Потому выращивание черешни в районе Сергиева Посада и Дмитрова весьма рискованно. Здесь черешня плодоносит менее регулярно, и урожай бывает значительно ниже. Так, на опытном участке Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства (ВСТИСП), расположенном к югу от Москвы, за последние десять лет плодоношения черешни урожайными были девять. В период полного плодоношения средний урожай по сортам составил 16 кг с дерева. На садовых участках к северу от Москвы из десяти лет лишь 5 раз черешни были с урожаем, который колебался от 8 до 12 кг с дерева.

Другая причина неудач — близкое (менее 1,5 м от поверхности почвы) расположение грунтовых вод. Черешня любит рыхло-комковатую почву, хорошо пропускающую для воды и воздуха. Переувлажнение её угнетает, ослабляет рост. Годичные приросты побегов уменьшаются до 8—10 см. Уже в возрасте 5—6 лет усыхает вершина дерева, затем небольшие ветви, немного позже — крупные. Бывает, что грунтовые воды находятся

Prunus cerasus



В древне-русском языке слово «черешня» впервые встречается в «Хождении игумена Даниила» (1106—1107 гг.).



глубоко, но из-за близкого (на глубине 40—60 см) расположения плотной глинистой породы талая вода стоит весной две-три недели. Это приводит к вымоканию корней, которые задыхаются от недостатка кислорода. Чтобы этого не случилось, вокруг садового участка нужно прорыть канавы глубиной 60—80 см для отвода лишней воды.

Нередко случается, что черешня обильно цветёт, но завязывает единичные плоды. Одна из причин этого — **отсутствие сортов-опылителей**. Как известно, черешня относится к числу самобесплодных культур. Она не завязывает плоды от опыления собственной пылью. При посадке деревьев одного сорта завязываются лишь единичные плоды, поэтому на садовом участке нужно посадить как минимум две черешни разных сортов. Желательно сажать их поближе — в 3—4 м друг от друга. Посадка саженцев черешни попеременно с другими плодовыми культурами (яблоней, грушей, сливой) или размещение в разных концах участка не обеспечит взаимное перекрестное опыление сортов и хорошее их плодоношение. Как правило, имеющиеся в настоящее время со-

рта черешни цветут приблизительно в одно и то же время и хорошо друг друга опыляют.

Чтобы черешни хорошо росли и плодоносили, за ними нужно ухаживать (проводить обрезку, вносить удобрения, поливать в засушливые годы). Учитывая, что **черешня любит нейтральные и слабокислые почвы**, а преобладают в Подмосковье дерново-подзолистые кислые почвы, **желательно один раз в 3—4 года проводить известкование**. Если почвы лёгкие — вносят 300—400 г извести на 1 м², если тяжёлые — в два раза больше. Осенью или рано весной известь равномерно разбрасывают под кроной деревьев и заделывают на глубину 15—20 см. На известкованных почвах растения лучше усваивают основные элементы питания из внесённых удобрений. Известь также необходима дереву для формирования косточки.

Сила роста, регулярность плодоношения и долговечность деревьев черешни во многом определяются типом подвоя. Для выращивания черешни в средней полосе могут быть рекомендованы вегетативно размножаемые подвои ВЦ-13.

Вверху:

Старинная открытка «Напоминание с черешней»

Сорта:

1. 'Синявская';
2. 'Красная Горка';

ЛЦ-52, 'Московия'. Если в качестве подвоя использовать вишню, то в первые три-четыре года черешни хорошо растёт и начинает плодоносить. Но к семи-девяти годам в месте срастания привоя с подвоем появляется утолщение (фото), которое говорит о несовместимости привитого сорта с подвоем. Такие деревья недолговечны. Поэтому, покупая саженцы, поинтересуйтесь, на каком они подвое.

Успех выращивания черешни в Подмоскovie во многом зависит от правильного подбора сортов. Нередко случается, что в погоне за наживой перекушники привозят саженцы из южных районов России, с Украины и Молдовы. Да, там растут сорта с крупными плодами десертного вкуса, но нам они не подходят. Ближайшая суровая зима будет последней в их недолгой жизни. Поэтому покупайте саженцы только в известных, хорошо зарекомендовавших себя питомниках, научных учреждениях и фирмах. Лучше, если это будут сорта, включённые в Государственный селекционный достижений и утверждённые для выращивания в Центральном регионе России (под №3). Это 'Фатеж', 'Чермашная', 'Ипут', 'Ревна', 'Брянская Розовая', 'Садко', 'Овстуженка', 'Тютчевка', 'Речица', 'Радица'. Заслуживают внимания и новые районированные сорта: 'Аделина', 'Бряночка', 'Контрастная', 'Лена'. Скорее они должны появиться в продаже. Проходят изучение сорта черешни 'Синявская', 'Северная', 'Гастинец',

'Москворецкая'. Многолетние наблюдения показали высокую зимостойкость большинства северных черешен и регулярное их плодоношение при посадке к югу от Москвы. Из-за недостаточной зимостойкости был забракован сорт 'Сердечко'.

Остановлюсь на описании некоторых новых сортов.

'Аделина'. Сорт среднего срока созревания. Выведен во ВНИСПК (г. Орёл). Дерево среднерослое (высотой до 3,5 м) с пирамидальной кроной средней густоты. Среднего срока цветения (10—15 мая). Плоды крупные (5,5—6,0 г), сердцевидной формы, тёмно-красные, хрящеватые, средней плотности, десертного вкуса (4,7 балла). Косточка мелкая, от мякоти отделяется хорошо. Срок созревания — середина июля. Самоплодный. Лучшие опылители: 'Позина', 'Речица', 'Теремощка'. Зимостойкость дерева хорошая, а цветковых почек — средняя. Урожайность средняя (15—20 кг с дерева). Скороплодный (вступает в плодоношение на 4-й год). Сорт столового назначения.

Достоинства сорта: хорошая зимостойкость, урожайность, высокие вкусовые качества плодов.

'Бряночка'. Сорт позднего срока созревания. Выведен во Всероссийском НИИ люпина (сеянец 8-14 × 'Красная Плотная'). Автор М. В. Каньшина. Дерево среднерослое, с округло-овальной, редкой



фото
верху:
совмести-
сть черешни
подвоем
ени.

изу сорта:
'Брянская
'Розовая',
'Чермашная'.



ФОТО АНДРЕЯ СЕДОВА



На фото сорта:

5. Любимица Астахова;
6. Садко.

кроной. Плоды выше средней величины (4,7 г), темно-красные, сочные, сладкие (вкус 4,7 балла). Мякоть плотная, плодоножка средней длины и толщины, отрыв плода сухой. Цветение и созревание позднее. Вступает в плодоношение на 5-й год. Самоплодный, лучшие опылители: 'Тютчевка', 'Инути'. Средняя урожайность 15—20 кг с дерева.

Достоинства сорта: высокая потенциальная продуктивность, зимостойкость, хорошее качество плодов.

'Лена'. Сорт позднего срока созревания. Получен в НИИ люпина. Отобран среди сеянцев 'Брянской Розовой'. Дерево среднерослое. Крона округло-овальная, приподнятая, средней густо-

ты. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: 'Ревна', 'Инути', 'Тютчевка', 'Овстуженка'. Плодоносит преимущественно на букетных веточках. Плоды темно-красные, крупные, средней массой 6 г. Отдельные плоды достигают 8 г, что является мировым стандартом для черешни. Мякоть плотная. Косточка средняя, хорошо отделяется. Вступает в плодоношение на 4-й год. Средняя урожайность 20—25 кг с дерева. Сорт универсального назначения.

Достоинства сорта: высокая урожайность, хорошая зимостойкость, крупноплодность, устойчивость к грибным болезням.

Как видите, северные сорта черешни можно успешно выращивать к югу от Москвы и рискованно — в районах к северу и северо-востоку от столицы. Необходимо помнить и по возможности выполнять требования культуры к условиям произрастания. Тогда вас ожидает успех. ✂



ФОТО АНДРЕЯ СЕДОВА



РЕЦЕПТ ОТ ВЛАДИМИРА ТУРКИНА

Когда у нас созревает урожай черешни, невольно задумываешься, что же с ним делать. Варенье сварено, друзьям роздано, а черешни всё ещё много! Решили сделать из неё наливку. Сделали. Понравилось. Угостили друзей, им она тоже пришлась по вкусу. С тех пор прошло уже 10 лет. И каждой осенью на нашем столе появляется наша наливочка под названием «Туркиновка».

В стеклянную бутылку закладываем промытую черешню с косточками на $\frac{1}{3}$ объёма, заливаем спирт, разведённый родниковой водой 1:1 (можно использовать водку) так, чтобы жидкость только покрыла ягоды. Закрываем крышкой. В течение месяца настаиваем. Раз в неделю для обогащения содержимого кислородом настой сливаем в другую ёмкость и тут же заливаем обратно. Через месяц настой сливаем, ягоды выбрасываем, а на каждый литр наливки добавляем 150—200 г сахара. Размешиваем и оставляем на неделю, затем разливаем по бутылкам.