

# АНГЛИЙСКИЙ «ГЕРЦОГ» – В РУССКОМ САДУ



В переводе с английского «дюк» означает «герцог».

Так в русском языке называют гибриды вишни и черешни. Их русские названия – вишнево-черешневые гибриды, вишне-черешни или черевешни – оказались слишком длинными и неблагозвучными, и садоводы заменили их более коротким и емким английским словом.



## ЗА ЧТО ЦЕНЯТСЯ ДЮКИ

Первые сорта вишне-черешневых гибридов появились в Западной Европе, где вишню и черешню часто выращивали рядом в одном саду. Самым ценным из них оказался английский сорт **Мэй Дюк** (Майский герцог), появившийся еще в XII в. (у нас он также известен под названием **Английская ранняя**). Этот сорт очень удачно объединил достоинства плодов черешни и вишни: от черешни взял крупный размер, сладость, раннее созревание, от вишни – легкую кислоту и чудесный аромат.

Первый отечественный сорт вишне-черешни создал в 1888 г. И.В.Мичурин, скрестив среднерусский сорт вишни **Бель** с немецкой черешней **Винклера белая**. Он получил название **Краса севера**; в свое время его с успехом выращивали не только в Мичуринске, но и под Москвой, Санкт-Петербургом, в Среднем Поволжье и даже некоторых районах Западной Сибири. В 1926 г. Мичурин создал еще один сорт дюка – **Ширпотреб черная**.

Листья у дюков значительно крупнее, чем у вишни, по величине близки к листьям черешни, но более

плотные и с характерным вишневым блеском. Плоды обычно гораздо крупнее, чем у вишни. У лучших сортов они не мельче, чем у крупноплодных черешен, со средней массой 6–10 г, а отдельные достигают 15 г, что в 3–5 раз превышает массу наших обычных вишен типа **Шубинки** и **Владимирской**. По вкусу и консистенции мякоти их плоды ближе к подам вишни. У них характерные вишневые аромат и кислота, но эта кислота приятная и легкая.



По зимостойкости многие дюки ближе к вишне и значительно превосходят черешню. Это хорошо проявилось в суровую зиму 2005–2006 гг., с морозами до -40...-42°C, которую многие дюки перенесли гораздо лучше самых зимостойких северных черешен. Среди других их достоинств – повышенная, по сравнению с сортами вишни, устойчивость к болезням: коккомикозу и монилиозу. В последние годы они стали главной проблемой при выращивании вишни.



## ГДЕ И КАК САЖАТЬ

Агротехника выращивания дюков практически такая же, как и у вишни. Учитывая, что зимостойкость у них, по сравнению с обычной вишней, сниженная, для посадки следует выбирать места с наиболее благоприятным микроклиматом. Такие участки располагаются в верхней и средней части юго-западной и западной экспозиции, на высоких плато, расчлененных оврагами и балками, по которым стекает вниз холодный воздух. Малоприспособлены территории, расположенные в замкнутых низинах, на окраинах больших болот, низких равнинах, где зимой застаивается холодный воздух.

В саду для дюков выбирают защищенные места с южной или западной стороны, которые хорошо освещаются солнцем. Сильнорослые сорта, такие как Чудо-вишня, Крепкая, Превосходная Веньяминова сажают на расстоянии 4–5 м друг от друга, среднерослые сорта – до 3,5–4,0 м, слаборослые (Саратовская малышка, Шпанка донецкая, Перл корай) – 3,0–3,5 м.

Как правило, в наших питомниках дюки прививают на сеянцы антинки (магалебской вишни), плохо растущей на богатых черноземах и тяжелых глинистых почвах. Такие саженцы требуют легких супесчаных почв. Поэтому для них готовят большие посадочные ямы диаметром около 1,0 м и глубиной 60–80 см. Заправляют их смесью плодородной почвы и песка в соотношении 1:1. Если почва кислая, то добавляют 1,0–1,5 кг молотого известняка или мела и тщательно перемешивают его с почвенной смесью.

## ЛУЧШИЙ ОПЫЛИТЕЛЬ – ЧЕРЕШНЯ

Еще один важный момент, который необходимо учитывать при посадке дюков, – наличие опылителей. Практически все сорта дюков самообесплодные и являются плохими опылителями друг для друга. Хорошие опылители для дюков – сорта черешни. В южной зоне, где черешня распространена в культуре и растет почти в каждом саду, проблема с опылителями остро не стоит. Но на севере желательно посадить в саду 2–3 северных сорта черешни.

Виринские, хорошо опыляются дюки и самоплодными сортами вишни, например, такими как Любская, Молодежная, Сканька. Проблема только в том, что подобные сорта иногда цветут позднее дюков. В теплую дружную весну сроки их цветения перекрываются, и опыление протекает нормально. А вот в затяжную холодную весну дюки могут отцвести раньше, чем самоплодные вишни, и их урожай будет сниженным.

## ПОДКОРМКИ ДЮКАМ – ВО ВРЕД

Удобрять дюки, особенно в северных районах, не рекомендуется (как и северную черешню). Обильное питание приводит к усиленному росту дерева, его затягиванию до поздней осени и плохой подготовке к зиме. Такие деревья сильно подмерзают или гибнут. Особенно это относится к дюкам, привитым на антинке. Достаточно ежегодно осенью перекапывать приствольный круг вилами, а в течение лета мульчировать его скошенной в междурядьях травой.



Чудо-вишня – вступает в плодоношение на 4–5-й год, урожайная, устойчивая к болезням, обладает хорошей засухоустойчивостью и зимостойкостью

Впрочем, понятие «хороший урожай» у садовода-дачника слишком субъективно. На дачных участках и вишня редко дает больше 1–2 кг с дерева. Хорошим же урожаем для дюка считается 30–40 кг с дерева.

## ПРАВИЛЬНО ФОРМИРУЕМ КРОНУ

Саженец дюка после посадки и первые 4–5 лет нуждается в формирующей обрезке. Первую проводят сразу после посадки. Если был высажен неразветвленный саженец, его обрезают на высоте 60–70 см. Если у дерева есть крона, то оставляют центральный побег и 3 наиболее сильные боковые ветви, расположенные равномерно с разных сторон и отходящие от стволика под тупым углом. Все остальные вырезают на кольцо, т.е. не оставляя пенька. Затем укорачивают оставленные боковые ветви на 1/3–1/2 длины так, чтобы после обрезки их концы оставались на одном уровне. Центральный проводник также укорачивают, его вершина должна быть на 20–25 см выше уровня боковых побегов.

В последующие годы закладывают второй ярус ветвей, он должен находиться на 50–60 см выше верхней ветви 1-го яруса и состоять из 2–3 ветвей. Боковым ветвям, появляющимся на нижних скелетных ветвях, дают возможность расти свободно. На кольцо вырезают только ветви, растущие внутрь кроны и загущающие ее. На 5-й год центральный проводник вырезают на кольцо на уровне отхождения последнего яруса скелетных ветвей. Основной принцип обрезки уже сформированных скелетных ветвей – перевод их на ответвления, растущие более полого и в стороны. Все ветви, отходящие круто вверх и внутрь кроны, вырезают на кольцо или укорачивают.

При формировке молодого дерева следует избегать сильного укорачивания побегов – это влечет образование многочисленных боковых разветвлений, загущающих крону.



Формирующая обрезка для дюков обязательна, иначе дерево станет сильно расти в высоту, образуя редкую крону. Урожай с него будет в 2–3 раза ниже, чем у правильно сформированного. Для ограничения роста дерева в дальнейшем придется удалять толстые ветви, что приводит к сильному камедетечению, проникновению инфекции и недолговечности дерева.



## Основные характеристики дюков

| Сорт                                                      | Масса плода | Цвет плода     | Зимостойкость                 | Особенности сорта                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Сорта, созревающие в первую пятидневку (с 16 по 20 июня)  |             |                |                               |                                                 |
| Чудо-вишня                                                | 10–12 г     | Темно-красный  | Хорошая                       | Не рекомендуется выращивать севернее Черноземья |
| Крепкая                                                   | 5–6 г       | Темно-красный  | Высокая                       | Является ценным промышленным сортом             |
| Прен корай                                                | 4–5 г       | Темно-красный  | Лучший сорт из представленных | Заслуживает разведения в средней полосе         |
| Сорта, созревающие во вторую пятидневку (21–25 июня)      |             |                |                               |                                                 |
| Саратовская малышка                                       | 5–6 г       | Темно-красный  | Хорошая                       | Отличается сдержанным ростом дерева             |
| Мелитопольская радость                                    | 6–7 г       | Почти черный   | Хорошая                       |                                                 |
| Сорта, созревающие в третью пятидневку (26–30 июня)       |             |                |                               |                                                 |
| Кормилица                                                 | 7–8 г       | Темно-красный  | Хорошая                       |                                                 |
| Фесанна                                                   | 8–9 г       | Темно-красный  | Хорошая                       | Цветковые почки могут подмерзать                |
| Спартак                                                   | 6–7 г       | Темно-красный  | Высокая                       | Для северных районов                            |
| Сорта, созревающие в четвертую пятидневку (1–5 июля)      |             |                |                               |                                                 |
| Ивановна                                                  | 6–7 г       | Темно-красный  | Высокая                       | Дерево сдержанного роста с высокой урожайностью |
| Донецкий великан                                          | 8–9 г       | Темно-красный  | Высокая                       | Может пострадать от засухи                      |
| Пшоян                                                     | 8–9 г       | Темно-красный  | Недостаточная                 | Для любительских садов                          |
| Сорта, созревающие в пятую пятидневку (с 6–10 до 15 июля) |             |                |                               |                                                 |
| Превосходная Веняминова                                   | 6–7 г       | Красный        | Хорошая                       | Дерево сильнорослое                             |
| Шпанка донецкая                                           | 7–8 г       | Светло-красный | Хорошая                       | Сорт с частичной самоплодностью                 |



**Крепкая** – крона округлой формы, сорт раннего срока созревания, зимостойкость дерева и камбия высокие, урожайность выше средней

**Прен корай** – урожайность хорошая (до 20–25 кг с 8–10-летнего дерева), отличная зимостойкость



## УРОЖАЙНЫЕ И ЗИМОСТОЙКИЕ СОРТА

Целая серия сортов дюков была выведена автором совместно с Л.И.Тараненко. В 1997 г. мы заложили сад, в котором проходили испытание свыше 30 новых сортов. Период их созревания растянулся на месяц – с середины июня до середины июля. Плоды дюков (так же, как вишни и черешни) после созревания сохраняются на дереве без потери качества не более 5 дней. Поэтому принято весь период созревания у этих косточковых культур делить на пятидневки. У дюков таких пятидневок 5. Для каждой из них мы выделили лучшие сорта, рекомендуемые для посадки в промышленных и любительских садах.

## Самые ранние

Среди сортов, созревающих в первую пятидневку (с 16 по 20 июня), по качеству плодов и урожайности лучший – **Чудо-вишня**. Плоды очень крупные, мякоть темно-красная, сочная, сладкая с легкой кислинкой, отличного вкуса. По внешнему виду и типу плодоношения сорт очень похож на черешню. В обычные зимы на юге Черноземья зимует хорошо и ежегодно обильно плодоносит, но в суровые зимы подмерзает.

Самое ценное качество сорта **Крепкая** – плотная мякоть плодов, что позволяет перевозить их на большие расстояния, при этом они не мнутся и не текут. Плоды мельче, чем у Чудо-вишни, хорошего вкуса, сладкие, с небольшой кислотой. В отличие от остальных дюков, созревшие плоды способны висеть на дереве, не падая, до 2 недель. Дерево сильнорослое, с округлой кроной, высокозимостойкое.

**Прен корай** – старый французский сорт; среди старых европейских дюков он лучший по зимостойкости и вполне заслуживает разведения в средней полосе. Деревья небольшие, урожайные, плоды десертного сладкого с легкой кислотой вкуса.



В группе сортов, созревающих во вторую пятидневку (21–25 июня), лучший – **Саратовская малышка**. Отличается сдержанным ростом дерева (не выше 2,0–2,5 м) и высокой урожайностью. Плоды крупные, с десертным кисло-сладким вкусом. Они скрыты внутри кроны, поэтому их мало расклевывают птицы. В этот же срок созревает сорт **Мелитопольская радость**. У него крупные, интенсивно-окрашенные плоды. Мякоть нежная, очень сочная, сладкая с легкой кислотой, отличного вкуса. Зимостойкость у обоих сортов хорошая: их деревья не пострадали при -40...-42°C.

#### Группа среднеспелых

В средний срок, в третью пятидневку (26–30 июня), по комплексу признаков лучший из сортов – **Кормилица**. По качеству плодов к нему близок сорт **Фесанна**. Оба сорта имеют крупные плоды отличного вкуса, они сладкие на вкус, с легкой приятной кислотой и сильным приятным ароматом. Зимостойкость у обоих сортов хорошая, но цветковые почки у Фесанны часто подмерзают. Сорт **Ходоса** немного уступает по вкусу двум вышеупомянутым, но урожайность у него значительно больше, и плодоносит он регулярнее.

**Спартак** несколько уступает другим сортам этой группы и по размеру плодов, и по вкусу. Мякоть плодов очень нежная, и после съема они «текут», так что этот сорт скорее для домашнего сада. Зато у него высокая зимостойкость дерева и цветковых почек. Поэтому особенный интерес он представляет для северных районов.

Еще одна большая группа дюков созревает в четвертую пятидневку (1–5 июля). Сорт **Ивановна** – лучший среди них по комплексу признаков. Дерево сдержанного роста, урожайность высокая, ежегодная, зимостойкость высокая. Плоды крупные, сочные, хорошего кисло-сладкого вкуса.

У созревающего в этот же срок сорта **Донецкий великан** плоды крупные, отличного вкуса. Но урожайность у него ниже, чем у сорта **Ивановна**, и он сильнее страдает от засухи.

Для любительских садов интересен также созревающий в четвертую пятиднев-



**Превосходная Веньяминова** – крона обратно пирамидальная, приподнятая, средней густоты, в плодоношение вступает на 4-й год, урожайность средняя 101 ц/га, максимальная 173 ц/га

ку сорт **Пивоня**. Он имеет крупные хорошего вкуса плоды. Но есть у него и «минусы»: сильнорослое дерево, недостаточная зимостойкость цветковых почек и, как следствие, сниженная и нерегулярная урожайность.

#### Созревают последними

Завершается сезон дюков пятой пятидневкой (с 6–10 до 15 июля). Сорт **Почка** очень похож на сорт **Ивановна**, но все же уступает ему по ряду признаков: дерево более сильнорослое, урожайность ниже, а плоды окрашены менее интенсивно, цвет мякоти – красный.

У сорта **Превосходная Веньяминова** урожайность высокая, но в пору плодоношения он вступает довольно поздно, а урожай первые годы сравнительно невысокий. Дерево сильно-рослое, плоды крупные. Мякоть окрашена слабо, темно-розовая, гармоничного кисло-сладкого вкуса, но, все же, с избытком кислоты.

**Шпанка донецкая** выделяется крупными плодами с желтой мякотью. Это единственный среди дюков сорт с частичной самоплодностью. Дерево слабо-рослое, в период плодоношения буквально усыпано плодами.

Александр Сыров,  
кандидат сельскохозяйственных наук



**Кормилица** – сорт среднего срока созревания, зимостойкость деревьев, камбия и цветковых почек высокая



**Ивановна** – сорт среднеспозднего срока созревания, зимостойкость деревьев, камбия и цветковых почек высокая, урожайность высокая и регулярная



**Шпанка донецкая** – сорт среднеспозднего срока созревания, зимостойкий, урожайность хорошая, дегустационная оценка вкуса плодов 4,0 балла