

ГРУШИ — «СЕВЕРЯНКИ»



Тонковетка Уральская — начало плодоношения на 5-й год после окулировки, урожайность хорошая, ежегодная

Неподалеку от города Великий Устюг климат для груш, прямо скажем, не самый подходящий. Однако местный садовод **Георгий Ивашевский** умудряется выращивать в этих северных местах эту теплолюбивую культуру. Он щедро делится опытом с нашими читателями. А секрет его успеха — в умелом сочетании различных агротехнических приемов, позволяющих повысить зимостойкость груши.

Решающую роль при выборе плодовых культур и методов садоводства играет географическое положение нашего сада. В моем случае сад расположен на полпути от Москвы к полярному кругу, неподалеку от г. Великий Устюг (широта 60°46' N, долгота 46°21' E). Следовательно, для читателей, живущих южнее и западнее Великого Устюга, выбор способов выращивания груши будет шире. Севернее и восточнее климат суровее, и садоводам предстоит самостоятельно испытать сорта груш в условиях своего региона.

Чередой мягких зим в последние годы, успешная зимовка яблонь, подвигли меня на рискованный шаг — посадить в саду груши. Как и большинство садоводов, начал я знакомство с грушей с покупки саженцев, это были сорта **Северянка** и **Скороспелка**. И хотя деревья были из местного питомника, они ежегодно обмерзали выше уровня снега.

Моя первая прививка сорта **Скороспелка** успешно зимовала под снегом, но не зацветала в течение 5–6 лет, хотя, по всем правилам, это должно было произойти на 2–3-й год после нее. Причина оказалась простой — нехватка света. Как только я убрал с восточной стороны затеняющую преграду, привитая ветка зацвела уже на следующий год. Как известно,

груша — светолюбивая культура, поэтому на Севере этому приходится уделять особое внимание. Для посадки нужно выбирать место, освещаемое солнцем весь световой день.

И это не единственное условие для удачного выращивания груши. Чтобы деревья не страдали от морозов, а цветки и завязи — от весенних заморозков, груши здесь нужно сажать на возвышенном участке, где более тяжелый холодный воздух не задерживается, «стекая» в низины. Изучив литературу по садоводству, я нашел несколько способов, которые помогли мне увеличить зимостойкость груши.

ПРИВИВКА НА АРОНИЮ И ИРГУ

Первый способ: прививка груши на черноплодную рябину (аронию) и иргу — эти кустарники растут почти в каждом саду. Чаще всего использую наиболее простой метод прививки — «в расщеп», иногда — улучшенную копулировку. Прививку «в расщеп» удобнее выполнять на аронии, т.к. у ирги из-за скрученной структуры ствола ее делать сложнее. С другой стороны, ирга дает больше поросли, необходимой для прививок.

Чтобы не уплывать кусты подвоя, нельзя перепрививать грушей все ветки. Для полноценного питания корней надо оставлять под прививкой ветви подвоя.

Чтобы привой прижился

Подвой и привой должны быть не подмерзшими; привой — вызревшим и не засушенным. Их срезы должны быть светлого цвета (и древесины, и внутренний слой коры). Для прививки использую молодые побеги подвоев 1–2-го года.

Инструмент (секатор, нож) использую острый, чтобы не мять срезы. Перед работой я протираю его спиртом (или крепкими настойками), а привой с подвоем — чистой тряпочкой.

При совмещении срезов нужно обеспечить совпадение слоев камбия (граница коры и древесины), операцию нужно выполнять быстро, чтобы срезы не подсыхали. Место прививки обматываю лентами, нарезанными из полиэтиленовых пакетиков (из-под хлеба и др. продуктов), обмотку провожу строго снизу вверх. При прививке «в расщеп» для лучшего прилегания срезов плотно связываю их веревкой, в результате приживается не менее 90% прививок.

Нормальной высотой прививки от корневой шейки считаю 0,5–0,7 м. Длинные черенки приживаются хуже, оптимальное количество почек на привитом черенке — 2–4 шт. (без учета среза). Верхний срез прививки замазываю садовым варом, им же замазываю поверх полиэтиленовой пленки верхний край контакта прививки с подвоем.

Плодоносящей груше, привитой на аронию, иргу, необходима подвязка к опоре, шпалере.

Для опыления — несколько сортов

Чтобы груша нормально плодоносила, желательно иметь несколько сортов для перекрестного опыления. Учитывая, что на подвоях аронии и ирги груша получается карликовой (1–2 м), для получения хорошего урожая приходится делать много прививок. Урожай с каждой прививки, в среднем, всего 10 плодов — это, конечно, «минус». Но у данного способа есть и «плюс» — возможность выращивать множество сортов на малой площади.



В качестве подвоя использована «дикая» рябина – прививка сделана в крону на высоте 3–4 м

Сортовые черенки можно заказать почтой, они в несколько раз дешевле саженцев. В Интернете несложно найти садоводов, занимающихся их реализацией.

Подбор сортов разного срока созревания дает возможность увеличить период потребления груши. Первыми, в конце августа, у меня созревают летние сорта; лучшие из них – **Северянка краснощекая** и **Лада**. У обоих сортов вкус очень хороший, лучше, чем у груш, которые можно купить у нас в торговой сети. Правда, срок хранения плодов небольшой – дней 10. В конце сентября собираю осенние сорта: **Осенняя Яковлева**, **Среднерусская**, **Перунеса** и др. Небольшие ночные заморозки до -5°C их плодам не вредят.

Зимовка под снегом

Когда установится погода с устойчивой отрицательной температурой, привитые груши пригибаю к земле. Чтобы прививки не обломались, пригибаю сначала подвой, закрепляю его, потом, при необходимости – грушу-привой. Ветви фиксирую воткнутыми в землю крючками или прижимаю палками с грузом. При таком способе укрытия у меня успешно зимуют даже «южные» сорта. Главная проблема подобной зимовки – мыши, которые безошибочно выедают из куста самые вкусные груши.

Для защиты от грызунов применяю отравленные приманки промышленного производства (обычно зерновые). В октябре выкладываю приманку на дощечку, рядом ставлю 1–2 опоры (кирпич), на них в виде наклонной крыши – другую дощечку или обломок шифера. Таким образом, приманка укрыта от размыва дождем и от птиц, может сохраняться под снегом. При обилии мышей порция яда съедается за 1 неделю, для верности добавляю ее повторно.

ПРИВИВКА В КРОНУ РЯБИНЫ

Второй способ выращивания груши в условиях Севера – прививка в крону «дикой» рябины на высоте 3–4 м. Данный метод, например, успешно практикуется садоводами Санкт-Петербурга.

Моим грушам, привитым на рябину, пока только 2–3 года, поэтому нормального плодоношения пока не было. Небольшое подмерзание древесины наблюдается у них только в самые суровые зимы.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
ТОВАРОВ ДЛЯ САДОВОДОВ
И ДАЧНИКОВ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ



19-22
апреля '12
Санкт-Петербург
СКК

Организатор
выставки:



тел.: +7 (812) 777-04-07, 718-35-37
nb@orticon.com,
www.farexpo.ru/green_week

Место проведения:

Санкт-Петербург, СКК
пр. Ю. Гагарина, 8
м. «Парк Победы»



Куст аронии с несколькими привоями груши – под прививкой оставлены ветви подвоем для полноценного питания корней

В кропе рябины у меня прижились сорта Лада, Сказочная, Бережная. Был еще один сорт Сибирской селекционной станции садоводства, который даже успешно отцвел в 2011 г. и завязал плоды, но в середине лета прививка неожиданно засохла. Таким образом, возможности данного способа выращивания груши в условиях Великого Устюга мне пока окончательно не ясны.

ПРИВИВКА НА ЗИМОСТОЙКИЙ ШТАМБ

Третий способ – прививка груши на зимостойкий штамб. Замечу, что наиболее перспективный путь – это все-таки выращивание груши деревом, но здесь нужен зимостойкий штамб. Для этой цели заказал уссурийскую грушу, которая должна выдерживать морозы -50°C . Но у меня она подмерзала уже при -40°C , и, по всей вероятности, это не уссурийская груша, а ее гибрид, сорт Ольга. Ее плоды вполне съедобные: удовлетворительного вкуса и без избытка терпкости.

Но все-таки мне удалось получить штамб и скелетные сучья с удовлетворительной зимостойкостью. Нижняя часть дерева формирует плоды удовлетворительного вкуса. Выше 2 м привиты сорта с более качественными плодами, но менее зимостойкие, например, Бережная, успешно пережившая уже две зимы. Еще несколько сортов привиты в этом году: Чижевская, Башкирская летняя, Большая.

Выращивая грушу на Севере, считаю неоправданным ограничиваться только одним из указанных способов; оптимально сочетание первого и третьего. Первый способ – самый надежный для сохранения сортов на случай особенно суровых зим. Второй – хорош для ускоренного выращивания дерева при отсутствии надежного сорта груши-скелетообразователя. Третий – позволит получить большой урожай с меньшими хлопотами.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА «СЕВЕРЯНКАМИ»

Сроки посадки груши обычные: весна и осень. Но я считаю, что весенняя посадка предпочтительнее – можно контролировать подготовку саженца к зиме. Еще один важный момент: ствол (корневая шейка) не должен находиться в

центре земляной воронки – в этом случае он будет вмерзать в лед, что травмирует кору. Наоборот, ствол должен подниматься над вершиной холмика, по окружности которого и делается бороздка для полива.

Полив на Севере, в обычные не засушливые годы, требуется только молодым саженцам груши. Например, в последние два года лето у нас исключительно засушливое. Воды на полив кустов и деревьев у меня не хватало, в результате качество плодов снизилось, к тому же, они были нетипично мелкого размера.

Почвы на Севере малоплодородные, а груша достаточно требовательна к плодородию почв. Поэтому без внесения удобрений не обойтись. Кто-то использует только минеральные, другие – исключительно органические. Отличаются и способы внесения – по поверхности, либо с заделкой в почву. Если способ внесения удобрений под плодовые деревья у вас отработан и полностью вас устраивает, то используйте именно его.

Прочитав книгу Н. Курдюмова «Мастерство плодородия», решил больше не перекапывать почву. Последние годы из удобрений использую, главным образом, органику (навоз, компост). Удобрение вношу по поверхности почвы летом, когда она прогреется, укладывая кучами в проекции кроны, отступив от ствола, чтобы избежать его загнивания. Получается и мульча, предохраняющая почву от пересыхания и образования «корки», и источник питания.

Весной дополнительно вношу доломитовую муку в лунки по границе проекции кроны на глубину 20–30 см. Это минеральное удобрение – источник кальция и магния, полезно и для нейтрализации кислых подзолистых почв, преобладающих в зоне тайги.

Из вредителей грушам в моем саду досаждают тля и долгоносики – на листьях, гусеницы – на листьях и плодах, плодожорка – на плодах. Для борьбы с ними в течение сезона использую 2–3-кратную обработку инсектицидами системного действия. Что касается болезней, то груши в моем саду от них не страдают. Правда, первые годы при выращивании недостаточно зимостойких саженцев наблюдалось почернение кончиков молодых листьев весной. Как предположили участники Интернет-форума, причиной может быть подмерзание ствола, нарушающее транспорт воды и питательных веществ, либо дисбаланс питательных элементов в почве.

При формировке дерева груши необходимо удалять лишние ветки – для улучшения освещенности кроны. Срок обрезки – ранняя весна. Чтобы избежать солнечных ожогов, желательно осенью проводить побелку ствола и скелетных ветвей.

Мнение эксперта

Рекомендовать такие способы выращивания данной культуры в столь суровых условиях очень сомнительно. Однако не отрицаю, что для частного любительского садоводства в небольших количествах это вполне возможно. Насчет выращивания груши на ирге и аронии в сланцевой форме сразу возникает вопрос: сколько лет ее можно так пригибать к земле? Приживаемость груши, привитой на аронию, иргу и рябину, по сравнению с прививкой на грушу, всегда очень низкая, а полученные растения очень недолговечны.

Евгений Сироткин