

Хотим  
урожаю

# Земляничная стратегия



Ольга Сырко,  
научный сотрудник лаборатории плодородства  
МСХА им. К.А. Тимирязева

**К**ак велик соблазн не мучиться с выбором, а высадить на участке только один «самый лучший» сорт! Но специалисты и опытные садоводы такого сорта никогда не порекомендуют. Почему? Как минимум по трем причинам.

Хотя современные сорта садовой земляники – самоплодные, то есть не нуждаются в других сортах-опылителях, но если посадить рядом несколько одновременно цветущих сортов, опыляемость и завязываемость ягод (следовательно, общая урожайность) у всех повышается.

При правильном подборе сортов из-за разницы в сроках созревания урожая можно собирать с середины июня до конца августа.

И третья причина – наши нестабильные климатические условия. Одни сорта биологически лучше приспособлены к жарким и засушливым условиям и вырывают вас в такие годы. Другие сорта, наоборот, не подведут и выдадут стабильный урожай даже в условиях холодного и сырого лета.

Все современные сорта садовой земляники делят на две основные группы – обычные (неремонтантные) и ремонтантные. В основу этого деления положена биологически обусловленная способность растений земляники закладывать цветковые почки в условиях так называемого «короткого» или «длинного» дня. Сейчас поговорим о наиболее обширной группе обычных, неремонтантных сортов. Они закладывают цветоносы в условиях высокой температуры и «короткого» дня один раз за вегетационный период. В нашей климатической зоне это

**В земляничных коллекциях ведущих питомников сотни сортов. Да и в обычных торговых центрах не менее десятка. Как разобраться в этом ассортименте и сделать правильный выбор?**

время со второй половины июля до середины августа, после плодоношения. Этот период очень важен для земляники. Цветение обычных сортов начинается обычно с середины мая, а созревание ягод – середины июня до начала августа. Именно из-за разницы в сроках созревания группу обычных сортов подразделяют на ранне-, средне- и позднеспелые сорта.

**Первые ягодки – хорошо, конечно, но...**

Раннеспелые сорта радуют нас самыми первыми и поэтому особенно желанными плодами. И многие начинающие и малоопытные садоводы стремятся сажать только такие сорта. А ведь как раз с ними и нужно быть особенно внимательными и осторожными.

В наших климатических условиях их цветение начинается во второй декаде мая, а начало созревания ягод – со второй декады июня. Именно с этими сроками и связаны главные трудности в выращивании раннеспелых сортов. Цветки могут быть практически полностью повреждены весенними заморозками, да и опыление затруднительно, если в это время установится прохладная и дождливая погода (что очень часто у нас бывает). А в первой половине июня начинающие созревать ягоды будут наиболее подвержены поражению серой гнилью, также из-за сырой погоды. К тому же прохладные и пасмурные июньские дни никак не способствуют накоплению в ягодах большого количества сухого вещества и самое главное – сахаров. Из-за этого и вкус у многих раннеспелых сортов кисловатый.

Для защиты растений от неблагоприятных погодных условий рекомендуют



высаживать ранние сорта там, где можно будет быстро соорудить легкие пленочные укрытия от весенних заморозков и заливных июньских дождей.

В прохладных северных районах, или на участках с неблагоприятным микроклиматом, в оврагах или низинах, где высока влажность воздуха и наиболее высока вероятность поздних весенних заморозков, от выращивания раннеспелых сортов лучше отказаться полностью. Масса первой самой крупной ягоды у большинства раннеспелых сортов, как правило, невелика – не более 15–20 г. Общая урожайность с одного куста тоже невысока – в среднем не более 300–400 плодов. Это значительно ниже урожайности других групп. Мякоть плодов сочная и рыхлая, кожица тонкая, это делает урожай раннеспелых сортов малопригодным к длительному хранению, транспортировке и каким-либо видам переработки. Увлекаться ранними сортами не стоит, но на теплых и сухих участках для их выращивания рекомендуют отводить 15–20% земляничника.

## Самые универсальные

Сорта среднего срока созревания по-настоящему универсальны и поэтому наиболее распространены. Их период массового созревания ягод у нас приходится, как правило, на конец июня – начало июля. В это время уже обычно устанавливается достаточно теплая и сухая погода, поэтому и плоды успевают накопить достаточное количество сухого вещества и сахаров. А плотная кожица обеспечивает хорошую лежкость, транспортабельность и пригодность к разного вида переработкам (замораживанию, варке компотов и варений).

Масса первой ягоды у сортов этой группы значительно больше и может быть от 25 до 30 г. Урожайность с одного растения также выше по сравнению с раннеспелыми сортами и составляет от 400 до 500 г. Для выращивания позднеспелых сортов рекомендуют отводить 25-30% земляничных посадок.

## Поздние нужны, не сомневайтесь

Относительно сортов позднего срока созревания у многих садоводов есть совершенно напрасное предубеждение: зачем же, когда получен и съеден урожай ранних и средних сортов, возиться с позднеспелыми? Но на самом деле именно поздние сорта являются рекордсменами как по крупноплодности, так и по общей урожайности в наших климатических условиях. Масса первой ягоды 35-45 г, а урожайность при хорошей агротехнике может быть до 1 кг с куста.

Именно позднеспелые сорта признаны эталоном вкуса. Дегустационные оценки их выше, чем у популярных сейчас ремонтантных сортов и гибридов. Да и для всех видов переработок они считаются лучшими. Период массового созревания плодов у них приходится на вторую декаду июля, а у появившихся сравнительно недавно так называемых сверхплодных сортов – на третью декаду июля и начало августа.

На поздние сорта отводят 30-40% площади.



‘Tranberry’ – поздний, очень сладкий сорт с красивыми и ровными плодами – украшение стола!

## Что еще важно знать

При выборе сорта интересуйтесь не только размерами ягод и урожайностью. Важна высота, облиственность и «усатость» сорта. Эти признаки никак не связаны со сроками созревания и являются биологическими особенностями сорта. Но от них зависит схема посадки растений и, соответственно, необходимое количество посадочного материала. Согласно научным рекомендациям, сильнорослые, густооблиственные и «усатые» сорта нужно сажать с большим расстоянием между растениями и рядами, соответственно 40 и 60 см. Для сортов малооблиственных и малоусых эти нормативы можно сократить до 25-30 см и 40 см.

Все обычные сорта можно и даже желательно высаживать рядом. У них сходные требования к агротехнике, да и для перекрестного опыления хорошо. Однако если в дальнейшем вы планируете самостоятельно поддерживать и обновлять свои земляники, рассаживая усы, то между сортами нужно предусмотреть расстояние не менее метра. Иначе через сезон вы получите настоящее «оливье» из сортов, в котором усатые сорта мгновенно вытеснят менее плодovитых соседей.

Неремонтантные сорта надо успеть высадить до середины августа. Тогда они успеют не только хорошо прижиться, но и заложить цветоносы для плодоношения следующим летом.

Внимательные читатели, наверное, уже недоумевают: 15-25% грядок на раннеспелые, 25-30% на средние и 30-40% на поздние сорта – 100% не складывается. Так вот на оставшихся грядках мы будем выращивать ремонтантные сорта, но о них разговор пойдет в следующем номере.

Вам нужен  
пустоцвет?  
**НЕТ!**  
Урожай начинается  
с **БУТОНА!**



## РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БУТОНА:

- ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ СТАНОВЯТСЯ КРУПНЕЕ И СЛАЩЕ
- УРОЖАЙНОСТЬ ПОВЫШАЕТСЯ НА 42%
- РАСТЕНИЯ ЛУЧШЕ ПЕРЕНОСЯТ ЗАМОРОЗКИ И ЗАСУХУ

# БОЛЬШЕ БУТОНОВ

# - БОЛЬШЕ ПЛОДОВ!



БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
**8-800-100-60-50**  
УЗНАЙ БОЛЬШЕ!  
[www.technoexport.ru](http://www.technoexport.ru)

Мы отобрали для вас лучшие сорта клубники. Купить их прямо сейчас можно в нашем интернет-магазине [www.plantarya.ru](http://www.plantarya.ru)